Rapport d'une observation commu-
niquée à l'académie par un chirurgien
de Louvre. Mr Herin

Cette observation a pour objet un postillon homme robuste, de 38 ans, mort à la suite d'une luxation complette de la jambe gauche avec rupture de ligamens, ayant été traîné par un cheval courant le galop qu'il avoit repris en se relevant après s'être abbattu, le postillon n'ayant pu se dégager la jambe luxée de la botte dont le pied a resté embarrassé dans l'étrier après sa chute.

Elle fut suivie de grandes douleurs, d'un gonflement considérable avec épanchement de sang jusqu'au milieu de la cuisse sans solution de continuité à la peau; la fièvre ne tarda pas à s'établir, elle devint très vive et fut accompagnée d'agitations.

Après la réduction qui fut aisée et dont le malade fut soulagé et après le pansement et avoir serré la partie, le malade fut saigné deux fois le reste de la journée et autant le lendemain.

Le 3e jour de l'accident il n'y avoit plus d'agitation ou la fièvre et la douleur étoient beaucoup diminuées quant au gonflement il étoit si considérable que le chirurgien en manda deux autres en consultation. ils conclurent tous unanimement de resaigner le malade encore deux fois. on parvint au 12 sans fièvre ni accidens nouveaux; mais à ce terme la fièvre se rallume, la douleur devint vive et il se manifesta une tumeur inflammatoire depuis l'articulation jusqu'au milieu de la cuisse et alors se remarqua entre le femur et le tibia un écartement de deux travers de doigts. Les consultans redemandés dans cette dernière circonstance, sentirent la nécessité de l'amputation; ils jugèrent cependant à propos de la

ARC 41
n° 22

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

differer a cause de linflammation et dans lintention d'en attendre la terminaison.

Le 14 la fluctuation commença a être Sensible, le 15 on fit l'ouverture de labcès et il en Sorti une grande quantité de pus Sanguinolent. deslors il ny eut plus a douter de la dilaceration des ligamens, la Separation des os etoit evidemment complette.

D'apres ces observations, les consultans deciderent de la necessité absolue de lamputation, et la proposerent comme lunique ressource aux parents et au blessé; mais ni les uns ni les autres ne voulurent y consentir.

Le 17 de nouveaux chirurgiens qui furent mandés, jugerent contre l'avis des precedens, que lamputation etoit inutile, et pretenderent qu'il Suffisoit deaggrandir la playe et detendre l'ouverture de labcès jusque dans larticulation. ce dernier avis ayant prevalu, le chirurgien ordinaire fut obligé de Sy conformer. peu de tems apres ~~depuis~~, letat du malade ne fut qu'empirer, le devoyement est Survenu, la Suppuration a pri un mauvais caractere; le 24 la parotide gauche et loreille se Sont tumefiées, on a fait alors une Saignée; loreille a Suppuré; le malade est devenu tres foible; Son ventre S'est elevé, bas l'hydropisie etoit confirmée. la ponction en ayant eté faite, il est Sorti environ 6 pintes d'eau. 10 jours apres on y est revenu et on en a tiré 8 autres pintes d'une eau tres puante et jaunie et le malade S'etant affoibli de plus en plus est mort le 48e de Son accident.

Cette observation me paroit d'autant plus interessante ~~tant par la multitude de ses details, que par le sujet,~~ qu'elle confirme la prevoyance du Celebre Mr petit, Sur la frequente necessité de lamputation dans la luxation de la jambe à Sa partie Superieure, lorsqu'il y a rupture de ligamens. elle merite detre accueillie pouvant Servir aux travaux de lacademie./:

Brun